

## Pneumokokk-nakkuse ja meningokokk-nakkuse riskirühmade vaksineerimisskeemid

### 1. Pneumokokkvaktsiinide PCV13 (Prevenar13), PCV10 (Synflorix) ja PCV15 (Vaxneuvance) kasutamine riskirühmadel

Vanus vaksineerimise alustamisel	Soovitav vaksineerimisskeem
6 nädalat - 6 kuud	3 doosi PCV13 või PCV10 või PCV15 (vaksineeritakse vähemalt 4-nädalase intervalliga) 4s doos 11-15 kuu vanuses
7-11 kuud	2 doosi PCV13 või PCV10 või PCV15 (vaksineeritakse vähemalt 4-nädalase intervalliga). 3. doos 12-15 kuu vanuses
12-23 kuud	2 doosi PCV13 või PCV10 või PCV15 (vaksineeritakse vähemalt 8-nädalase intervalliga).
24 kuud – 5 aastat	2 doosi PCV13 või PCV10 või PCV15 (vaksineeritakse vähemalt 8-nädalase intervalliga) ja 1 doos PPSV23 (vähemalt 8 nädalase intervalliga) ja 1 doos PPSV23* (5 a möödudes).
6 – 64 aastat	1 doos PCV13 või PCV15 ja 1 doos PPSV23 (vähemalt 8-nädalase intervalliga) ja 1 doos PPSV23* (5 a möödudes).
65 ja vanemad	1 doos PCV13 või PCV15 ja 1 doos PPSV23 (vähemalt 8-nädalase intervalliga) ja 1 doos PPSV23* (5 a möödudes).

\*Ainult kõrgeima riskiga patsiendid, kui kõrge risk invasiivseks infektsiooniks püsib.

### 2. Meningokokkvaktsiinide MenACWY-TT (Nimenrix) ja MenACWY-CRM<sub>197</sub> (Menveo) kasutamine riskirühmadel

Vanus vaksineerimise alustamisel	Vaktsiin	Soovitav vaksineerimisskeem
< 12 kuud (lubatud alates 6 nädala vanusest)	Nimenrix	2 doosi (8 nädalase intervalliga). Revaksineerimine: 12 kuu vanuses või hiljem.
>12 kuud lapsed ja noorukid	Nimenrix	1 doos
>24 kuud lapsed ja noorukid	Nimenrix Menveo	1 doos
Täiskasvanud <55	Nimenrix Menveo	1 doos
>56	Nimenrix	Andmed puudulikud

	Menveo	
Revaktsineerimine	Nimenrix Menveo	Ametlik soovitus puudub. Vajadusel võib revaktsineerida.

### 3. Meningokokkvaktsiinide MenB (Bexsero/Trumenba) kasutamine riskirühmadel

#### MenB (Bexsero)

Vanus vaktsineerimise alustamisel	Soovitav vaktsineerimisskeem
8 nädalat -5 kuud	2 doosi vähemalt 8-nädalase intervalliga Revaktsineerimine: 12-15 kuu vanuses või vähemalt 6 kuud peale esmasvaktsineerimist
6 kuud-11 kuud	2 doosi vähemalt 8-nädalase intervalliga Revaktsineerimine teisel eluaastal vähemalt 2 kuud peale esmasvaktsineerimist
12-23 kuud	2 doosi vähemalt 8-nädalase intervalliga Revaktsineerimine 1 doosiga vähemalt 12-23 kuulise intervalliga peale esmasvaktsineerimist
2 aastat – 50 aastat	2 doosi vähemalt 4-nädalase intervalliga Revaktsineerimist tuleks kaaluda. Ametlikud soovitused puuduvad
>50 aasta vanused	Andmed kasutamise kohta puuduvad

#### VÕIMALIK OSALINE ALTERNATIIV:

#### MenB (Trumenba)

NB! Seni Eestisse toodud ei ole

Vanus vaktsineerimise alustamisel	Soovitav vaktsineerimisskeem
10 – 25 aastat	2 doosi (vaktsineeritakse vähemalt 1-kuulise intervalliga). 3. doos 4 kuud pärast 2. doosi.
40 – 65 aastat	Andmed piiratud

65 ja vanemad	Andmed puuduvad
Revaktsineerimine	Suurema invasiivse meningokokilise haiguse riskiga patsientidel võib kaaluda.

**NB!** Bexsero ja Trumenba korral kasutada ainult üht vaktsiini.