



**Eesti Haigekassa**

**28.03.2016**

**Vastuseks teie kirjale 01.03.2016 nr 3-15/3500**

1. Taotluses nr 934 „Müeloomi või plasmotsütoomi säilitusravikuur patsientidele, kellel on teostatud autoloogne hemopoetiliste tüvirakkude siirdamine“ viidatud andmed kliinilisteuuringute kohta olid ajakohastatud eelmiseks taotlusperioodiks. Palume esitadalisainformatsiooni autoloogse hemopoetiliste tüvirakkude siirdamise läbinud patsientidel talidomiidi ja bortesomiibi säilitusravi võrdlevaist randomiseeritud kontrollitud uuringutest, mille tulemusi on avaldatud hiljem või kinnitada, et teadaolevalt sellist töendusmaterjali lisandunud ei ole.

Vastuse sellele küsimusele on koostanud Edward Laane ning see on lisatud eraldi failina

2. Taotluse nr 1157 „Ravikuur brentuximabvedotiiniga, 1 ravikuur“ osas palume esitada taotluses viidatud järgmise kirjandusallika täisteksti veebilink või elektrooniline koopia: P.L. Zinzania et al Experience of brentuximab vedotin in relapsed/refractory Hodgkin lymphoma and relapsed/refractory systemic anaplastic large-cell lymphoma in the Named Patient Program: Review of the literature. Critical Reviews in Oncology/Hematology 95 (2015) 359–369.

Palutud täistekst lisatud manusena

3. Taotluse nr 1158 „Gaucher'töve 1. tüübi ensüümasendusravi 1TÜ või miglustaatravi 4,78mg või eliglustaatravi 0,81mg“ osas palume esitada taotluses viidatud järgmise kirjandusallika täisteksti veebilink või elektrooniline koopia: Cox TM et al. Eliglustat compared with imiglucerase in patients with Gaucher's disease type 1 stabilised on enzyme replacement therapy: a phase 3, randomised, open-label, non-inferiority trial. Lancet. 2015 Jun 13; 385(9985):2355-62.

Palutud täisteksti esitame käesoleva nädala lõpuks

4. Taotlus nr 1159 „Kroonilise lümfotsütleukeemia keemiaravikuur“:
  - 1) haigekassa andmebaasi kohaselt on teenust 321R kasutatud 2015. aastal kokku 489 korda. Kuidas seletada Teie statistikat, mille kohaselt on teenust 2015 aasta esimese 9 kuu jooksul kasutatud 620 korda?;

Esialgses taotluses toodud 620 ravikuuri on 9 kuu andmete järgi prognoositud ravikuuride arv aastas. Kuna erinevus on ikkagi väga suur (620 versus 489 ravikuuri), siis vaatasin kriitilise pilguga uesti üle algandmed ning tuvastasin



mitmeid kiirustamiset tulenevaid ümberkirjutus ja arvutusvigu. Korrigeeritud prognoosi järgi on ravikuuride arv aastas 500. Jaotus erinevate raviskeemide vahel on lisataud eraldi exceli failina.

2) palun täpsustage iga skeemi koosseisus olevate toimeainete annused (v.a FCR).

Rituksimaab+kloorambutsiil: rituksimaab  $375 \text{ mg/m}^2$  (1. ravikuur)  $500 \text{ mg/m}^2$  (alates 2. ravikuurist) + kloorambutsiil  $0,5 \text{ mg/kg}$  1. ja 15. päev

R-CHOP: rituksimaab  $375 \text{ mg/m}^2$ , tsüklofosfamiid  $750 \text{ mg/m}^2$ , doktorubitsiin  $50 \text{ mg/m}^2$ , vinkristiin  $1,4 \text{ mg/m}^2$ , prednisoloon  $40 \text{ mg/m}^2 \times 5$  päeva

RB: rituksimaab  $375 \text{ mg/m}^2$  (1. ravikuur)  $500 \text{ mg/m}^2$  (alates 2. ravikuurist) + bendamustiin  $90 \text{ mg/m}^2 \times 2$  päeva

obinutuzumab+kloorambutsiil: obinutuzumab  $1000 \text{ mg} \times 3$  päeva (1. ravikuur)  $1000 \text{ mg} \times 1$  päev (alates 2. ravikuurist) + kloorambutsiil  $0,5 \text{ mg/kg}$  1. ja 15. päev

ofatumumab+kloorambutsiil: ofatumumab  $300 \text{ mg}$  1. päeval ja  $1000 \text{ mg}$  8. päeval (1. ravikuur)  $1000 \text{ mg}$  1. päeval (alates 2. ravikuurist) + kloorambutsiil  $10 \text{ mg/m}^2 \times 7$  päeva

5. Taatluse nr 1160 „Mitte-Hodgkini lümfoomi keemiaravikuur“ osas palume täpsustada iga skeemi koosseisus olevate toimeainete annused.

R-CHOP: rituksimaab  $375 \text{ mg/m}^2$ , tsüklofosfamiid  $750 \text{ mg/m}^2$ , doktorubitsiin  $50 \text{ mg/m}^2$ , vinkristiin  $1,4 \text{ mg/m}^2$ , prednisoloon  $40 \text{ mg/m}^2 \times 5$  päeva

CHOEP: tsüklofosfamiid  $750 \text{ mg/m}^2$ , doktorubitsiin  $50 \text{ mg/m}^2$ , vinkristiin  $1,4 \text{ mg/m}^2$ , etoposiid  $100 \text{ mg/m}^2$  prednisoloon  $40 \text{ mg/m}^2 \times 5$  päeva

R-DHAP: rituksimaab  $375 \text{ mg/m}^2$ , deksametasoon  $40 \text{ mg} \times 4$  päeva, tsisplatiin  $100 \text{ mg/m}^2 \times 1$  päev, tsütarabiin  $2000 \text{ mg/m}^2 \times 2$ , lisaks tavapärasele antiemeetikumile Emend

RB: rituksimaab  $375 \text{ mg/m}^2$  + bendamustiin  $90 \text{ mg/m}^2 \times 2$  päeva

Bendamustiin  $90-100 \text{ mg/m}^2 \times 2$  päeva

Rituksimab monoravina ja säilitusravina:  $375 \text{ mg/m}^2$

Piksantroon:  $85 \text{ mg/m}^2$  1., 8. ja 15. päev



R-EPOCH: rituksimaab 375 mg/m<sup>2</sup>, tsüklofosfamiid 750 mg/m<sup>2</sup> x 1 päev,  
doksorubitsiin 10 mg/m<sup>2</sup> x 4 päeva, vinkristiin 0,4 mg/m<sup>2</sup>, etoposiid 50 mg/m<sup>2</sup>  
x 4 päeva, prednisoloon 40 mg/m<sup>2</sup> x 5 päeva

Ain Kaare  
Eesti Hematoloogide Seltsi juhatuse liige