

- Palume täpsustada, milline on antud vaktsiinide efektiivsus, usaldusväärsus ja ohutus, kui neid kasutatakse diagnostiliseks immuniseerimiseks. Võimalusel palume esitada olemasolevad tõendus põhise andmed.

Usaldusväärsuse ja ohutuse osas ei ole eeldada erinevust võrreldes tavapärase vaktsineerimisega. Protseduuri efektiivsust ei ole tavapärasel mõttes võimalik hinnata, sest näidustus vaktsineerimise teostamiseks on teine kui tavapärase vaktsineerimise puhul. Rahvusvahelised uuringute ja konsensusdokumentide alusel on mõlemad vaktsiinid soovituslikud humoraalse immuunvastuse hindamiseks, kuigi arvestades pneumokoki konjugeeritud vaktsiini kasutamise sagedust, võib olla eelis Typhi Vi vaktsiini diagnostilisel eesmärgil kasutamisel.

- Kas on erisusi kahe kasutatava vaktsiini vahel? Mille alusel otsustatakse diagnoosimiseks kasutatav vaktsiini valik?

Eestis kasutatakse hetkel ainult Pneumovaxi, sest S Typhi vastaste antikehade määramiseks puudub kliinilises laboris rutiinselt kasutatav test. Konsensusdokumentide alusel kasutatakse polüsahhariidse pneumokoki vaktsiiniga immuniseerimist nii spetsiifiliste antikehade defitsiidi kui ka teiste antikehapuudulikkuste diagnoosimisel (osaks antikehapuudulikkuse diagnoosikriteeriumitest).