

<b>Indikaatori nimetus</b>	<b>Ägeda müokardiinfarkti haigete osakaal, kellele on haiglast väljakirjutamisel määratud statiinravi.</b>
<b>Indikaatori kirjeldus/ Vajaduse põhjendus</b>	Statiinravi kasutamine ägeda müokardiinfarkti (ÄMI) järgses perioodis vähendab kardiovaskulaarsete atakkide tekkeriski ja suremust. Indikaatori eesmärk on Eestis jälgida üleriigilist trendi.
<b>Definitsioon</b>	Patsiendid, kellele on ägeda müokardiinfarkti järgselt haiglast lahkumisel väljakirjutatud statiinravi.
<b>Indikaatori tüüp</b>	Protsessi indikaator
<b>Lugeja</b>	Y - ÄMI patsientide arv, kellele määratakse statiinravi haiglast lahkumisel
<b>Nimetaja</b>	N - ÄMI patsientide koguarv
<b>Valem</b>	$X (\%) = (Y/N) * 100$
<b>Sihtgrupp</b>	Ägeda müokardiinfarkti patsiendid
<b>Eeldused indikaatori arvutamiseks</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RHK kood I21-I22</li> <li>• Statiinravi välja kirjutamise kuupäev (ATC kood C10AA01-C10AA07)</li> <li>• Surma kuupäev</li> </ul>
<b>Sisse arvatud</b>	-
<b>Välja arvatud</b>	Haigla perioodil surnud haiged.
<b>Tõlgendus</b>	Eesmärk püstitatakse Eesti Kardioloogide Seltsi poolt eelneva aasta tulemuste analüüsi põhjal.
<b>Andmeallikad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Müokardiinfarktiregister</li> <li>• EHK andmebaas</li> </ul>
<b>Jälgimisperiood</b>	Jälgimisperiood 01. jaanuar – 31. detsember. Andmeid analüüsitaks 1 kord aastas.
<b>Edasine informatsioon</b>	Schiele F et al. Quality indicators for acute myocardial infarction: A position paper of the Acute Cardiovascular Care Association. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care 2017, Vol. 6(1) 34– 59.