

KULUTÕHUSUSE JA RAVIKINDLUSTUSE EELARVE MÕJU HINNANG

Teenuse nimetus	Teenuse „Ravi beetaepoetiiniga doosis 200 TÛ või darbepoetiiniga doosis 1 mikrogramm või metoksüpolüetüleenglükool epoetiin beetaga doosis 0,8 mikrogrammi renaalse aneemiaga statsionaarsel ravil viibival patsiendil või imikutel sünnikaaluga 750–1500 g ja gestatsioonieaga alla 34 nädala“ rakendustingimuste laiendamine
Taotluse number	1312
Kuupäev	06.2018

1. Lühikokkuvõtte taotlusest

Eesti Haigekassa esitas taotluse „Teenuse „Ravi beetaepoetiiniga doosis 200 TÛ või darbepoetiiniga doosis 1 mikrogramm või metoksüpolüetüleenglükool epoetiin beetaga doosis 0,8 mikrogrammi renaalse aneemiaga statsionaarsel ravil viibival patsiendil või imikutel sünnikaaluga 750–1500 g ja gestatsioonieaga alla 34 nädala“ rakendustingimuste laiendamine.“. Tervishoiuteenust 200R „Ravi beetaepoetiiniga doosis 200 TÛ või darbepoetiiniga doosis 1 mikrogramm või metoksüpolüetüleenglükool epoetiin beetaga doosis 0,8 mikrogrammi renaalse aneemiaga statsionaarsel ravil viibival patsiendil või imikutel sünnikaaluga 750–1500 g ja gestatsioonieaga alla 34 nädala“ võib tulenevalt teenuse sõnastusest kasutada ainult statsionaarsel ravil viibival patsiendil.

Lühitoimelist epoetiini kasutatakse enamasti aga hemodialüüsil, millega seoses manustatakse ravimit patsiendile päevaravi raames veeni. Lühitoimeline epoetiin on hetkel kättesaadav läbi apteegisüsteemi, mis tähendab, et ravi saamisele eelneb retsepti välja kirjutamine arsti poolt ning ravimi välja ostmine patsiendi poolt. Teatud juhtudel pole õige annusega ravim apteegist kohe kättesaadav. Kõik eelnev toob kaasa ravi viibimise.

2. Taotletava tervishoiuteenuse kulud

Teenuse 200R piirhind tulenevalt antud taotluse menetlusest ei muutu.

3. Kulutõhususe analüüs

3.1. Rahvusvahelised kulutõhususe hinnangud ja uuringud

Pole asjakohane

3.2. Kulutõhusus Eestis

Pole asjakohane

4. Ravikindlustuse eelarve mõju prognoos

4.1. Taotletava teenuse lühi- ja pikaajaline mõju ravikindlustuse eelarvele

Patsiendid, kes vajavad teenust 200R haiglas, kuid mitte statsionaarsel ravil viibimise ajal, saavad hetkel epoetiini soodustusega apteegist. Seega täiendav kulu teenuse nimetuse muutmisest puudub.

4.2. Patsiendi poolt tehtavad kulutused
Puuduvad

4.3. Teenuse väär- ja liigkasutamise tõenäosus ja majanduslikud mõjud
Pole asjakohane

4.4. Kohaldamise tingimuste vajalikkus tervishoiuteenuse ohutu ja optimaalse kasutamise tagamiseks
Teenusel 200R hetkel rakendustingimused puuduvad ning nende seadmist ei pea Haigekassa mõistlikuks.

5. Kokkuvõte

Esitatakse lühikokkuvõte koos hindaja selgituste ja põhjendustega tabelkujul

	Vastus	Selgitused
Teenuse nimetus	Teenuse „Ravi beetaepoetiiniga doosis 200 TÛ või darbepoetiiniga doosis 1 mikrogramm või metoksüpolüetüleenglükool epoetiin beetaga doosis 0,8 mikrogrammi renaalse aneemiaga statsionaarsel ravil viibival patsiendil või imikutel sünnikaaluga 750–1500 g ja gestatsioonieaga alla 34 nädala“ rakendustingimuste laiendamine	
Ettepaneku esitaja	Eesti Haigekassa	
Teenuse alternatiivid	Epoetiini ostmine apteegist.	
Kulutõhusus	Pole asjakohane	
Omaosalus	Puudub	
Vajadus	Pole asjakohane	
Teenuse piirhind	Ei muutu	
Kohaldamise tingimused	Teenusel 200R hetkel rakendustingimused puuduvad ning nende seadmist ei pea Haigekassa mõistlikuks.	
Muudatusest tulenev lisakulu ravikindlustuse eelarvele aastas kokku	Puudub	

<p>Lühikokkuvõte hinnatava teenuse kohta</p>	<p>Teenuse 200R nimetus võimaldab seda kasutada ainult statsionaarsel ravil viibimise ajal. Lühitoimelist epoetiini kasutatakse enamasti aga hemodialüüsil, millega seoses manustatakse ravimit patsiendile päevaravi raames veeni.</p> <p>Lühitoimeline epoetiin on hetkel kättesaadav läbi apteegisüsteemi, mis tähendab, et ravi saamisele eelneb retsepti välja kirjutamine arsti poolt ning ravimi välja ostmine patsiendi poolt.</p>	<p>Vältimaks ravi viibimist sõnastada teenuse nimetus ümber järgmiselt „Ravi beetaepoetiiniga doosis 200 TÛ või darbepoetiiniga doosis 1 mikrogramm või metoksüpolüetüleenglüko ol epoetiin beetaga doosis 0,8 mikrogrammi renaalse aneemiaga patsiendil või imikutel sünnikaaluga 750–1500 g ja gestatsioonieaga alla 34 nädala“</p>
---	--	---