

Lisaandmete küsimine tervishoiuteenuste loetelu muutmise ettepanekute kohta

Taotlus nr 1591 „Sõlmelise sügatõve ravi IL-4 retseptori α -ahela vastase antikehaga, 4-nädalane ravikuur“

Vastaja: Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts

6. Täpsustaksime veel ravipauside tegemist Eestis. Kas Eestis rakendatakse (nt atoopilise dermatiidi korral) või tõenäoliselt rakendatakse prurigo nodularise korral dupilumabi saavatel ja remissiooni saavutanud patsientidel Austriaga sarnast ravipraktikat (süsteintervallide pikendamine ja ravi peatamine).

Vastus:

Eestis atoopilise dermatiidi korral üldjuhul ravipause täppisravis ei tehta. Sageli saavad atoopilise dermatiidi täppisravi (nt dupilumabiga) üle 18 aastased patsiendid. Kui atoopiline dermatiit on inimesel püsinud täiskasvanueani või tekib täiskasvanueas, siis on haigus sageli püsivam. Seetõttu ei ole võimalik ka haigust kontrollivat ravimit sageli lõpetada. Atoopilise dermatiidi patsientidel, kellel on talviti (rasked) ägenemised ja suviti nahaseis parem on võimalik kaaluda ainult ägenemiste ajal ravimit kasutada. Üldiselt eelistatakse kirjanduses siis JAKinhibiitoreid (nt. upadatsitinibi), millel on kiiremini algav ravitoime.

Sõlmelisel sügatõvel pigem ei ole hooajalist erinevust - suvel ja talvel on lööbe intensiivsus sarnane. Sõlmeline sügatõbi on multifaktoriaalne haigus, mistõttu ei ole alati võimalik ennustada, kuidas haigus ajas kulgeb, mistõttu on (teoreetiliselt) suurema tõenäosusega võimalik ka ravi mingi hetk patsiendil lõpetada.