

Lisaandmed

Taotlus 1615 „Esmaselt diagnoositud kerge ahelaga amüloidoosi ravikuur daratumumabiga, üks manustamiskord“

Vastaja: UAB “Johnson and Johnson” Eesti filiaal

Millisel määral (%) võiks uus teenus asendada olemasolevaid raviskeeme?

Erialaekspertide hinnangul võib Eestis olla 3-5 esmaselt diagnoositud AL amüloidoosipatsienti aastas, kuid see arv võib olla suurem, kuna siiani on puudunud antud haiguse raviks hüvitatav ravi ning nende patsientide ravi kodeeritakse hulгимüeloomi ravina, seega täpne statistika puudub.

AL amüloidoosi diagnoosiga patsiendi ravi DVCd raviskeemiga kestab kliinilise uuringu kohaselt kuni haiguse progressioonini või maksimaalselt 24 tsüklit (~2 aastat). Aastate lõikes on prognoos uue teenuse kasutamiseks 1. aastal 174 korda, alates 2. aastast vahemikus 98–182 korda.

DVCd raviskeemi kasutuselevõtt 1. ravireas vähendab praegu kasutuses olevate VRd ja VCd raviskeemide kasutust kuni 10%, lisaks väheneks ka 2. ravireas nt DVd, KRd ning teiste raviskeemide kasutamine. Täpset prognoosi on keeruline öelda, kuna puudub selge ülevaade AL amüloidoosi patsientide arvust ning kasutatavate raviskeemide mahust.